INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Tadalafil Fortis 10 mg, tabletki powlekane *(tadalafilum)*

Lek Tadalafil Fortis, zawierający tadalafil, przeznaczony jest do leczenia zaburzeń erekcji, czyli niemożności uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do satysfakcjonującego stosunku płciowego. Ten lek może być wskazany dla dorosłych mężczyzn (> 18. r.ż.), którym problemy ze wzwodem utrudniają współżycie płciowe. Jeżeli spełnia Pan wszystkie powyższe warunki, proszę przejść do pytań poniżej.

Informacja dla pacjentów służy samoocenie możliwości zastosowania leku.

W celu bezpiecznego zastosowania leku proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu.

Pytanie	Odpowiedź TAK lub NIE WIEM	**Odpowiedź NIE**
Czy kiedykolwiek lekarz zalecił Panu powstrzymać się od aktywności seksualnej?	❍	❍
Czy ma Pan mniej niż 18 lat?	❍	❍
Czy w przeciągu ostatnich 36 godzin zażywał Pan inne leki na zaburzenia potencji?	❍	❍
Czy kiedykolwiek po zastosowaniu leku do leczenia zaburzeń potencji wystąpiły u Pana działania niepożądane (np. zaburzenia pracy serca, przedłużający się wzwód powyżej 4 godzin)?	❍	❍
Czy kiedykolwiek badaniem lekarskim stwierdzono u Pana chorobę serca (np. zawał serca, chorobę wieńcową, wady zastawek, niewydolność serca, niemiarowość pracy serca)?	❍	❍
Czy zdiagnozowano u Pana nadciśnienie tętnicze lub czy miewa Pan wysokie ciśnienie tętnicze (powyżej 150 / 90 mmHg?)	❍	❍
Czy ma Pan zwykle niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg)	❍	❍
Czy podczas codziennych aktywności (wchodzenie po schodach, ubieranie się, mycie, wysiłek fizyczny, zmiana pozycji ciała) występują u Pana duszność, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, wrażenie omdlenia, utrata przytomności)?	❍	❍
Czy ostatnio czuje się Pan zmęczony lub wyraźnie pogorszyło się Pana samopoczucie?	❍	❍
Czy stosujesz poniższe leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej, których przyjmowanie łącznie z Tadalafilem Fortis może zagrażać Pana życiu: - nitroglicerynę (np. Nitrocard, Perlinganit, Nitromint, Sustonit)? - izosorbid (np. Effox Long, Mononit, Olicard); - pentaerytrytol (np. Galpent, Pentaerythritol compositum) - molsidominę (np. Molsidomina WZF) - nikorandyl	❍	❍
Czy któraś z poniższych sytuacji dotyczy Pana: - czy w ostatnich 6 miesiącach przebyłeś zawał serca lub udar mózgu; - czy stwierdzono u Pana wady prącia (np. skrzywienie, chorobę Peyroniego – stwardnienie plastyczne prącia) utrudniające stosunek płciowy;		

Pytanie	Odpowiedź TAK lub NIE WIEM	**Odpowiedź NIE**
- czy przyjmuje Pan leki z powodu zakażenia wirusem HIV; - czy stosuje Pan leki z powodu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach), takie jak riocyguat (np. Adempas); - czy rozpoznano u Pana niedokrwistość sierpowatokrwinkową lub hemofilię; - czy rozpoznano u Pana marskość wątroby; - czy utracił Pan wzrok z powodów innych niż uraz, jaskra lub zaćma; - czy choruje Pan na zaburzenia funkcji siatkówki oka (tzw. zwyrodnienie barwnikowe) - czy choruje Pan na chorobę wrzodową żołądka, której objawy nasiliły się ostatnio; - czy leczy się Pan z powodu chorób nowotworowych (np. białaczki, szpiczaka mnogiego) - czy leczy się Pan z powodu rozrostu gruczołu krokowego (prostaty) i stosuje któreś z niżej wymienionych leków: - doksazosynę (np. Adadox, Cardura, Doxar, Dozox, Zoxon) - tamsulosynę (np. Adatam, Omnic, Omsal, Tamiron, Uprox, Urostad) - alfuzosynę (np. Alfabax, Alfuzostad, Dalfaz Uno/SR) - terazosynę (np. Hytrin, Kornam) - finasteryd (np. Adaster, Antiprost, Finaran, Finaride, Finaster, Propecia, Proscar, Zasterid) - dutasteryd (np. Adadut, Davoster, Dutafin, Duodart, Dutrozen)	❍	❍
Czy leczy się Pan z powodu grzybicy i przyjmuje któryś z leków wymienionych poniżej: - ketokonazol (np. Ketoconazole HRA) - itrakonazol (np. Itrax, Orungal, Trioxal) - flukonazol (np. Candifluc, Diflucan, Flucofast, Fluconazin, Fluconazole B. Braun 2 mg/ml, Flucorta, Flukonazol roztwór do infuzji 2 mg/ml, Flumycon, Fluxazol, Mycosyst)	❍	❍
Czy stosuje Pan leki takie jak: - fenytoina (np. Phenytoinum WZF, Phenytoin Hikma) - fenobarbital (np. Luminalum, Luminalum Unia, Bellergot) - karbamazepina (np. Amizepin, Tegretol, Neurotop retard) - terbutalina - teofilina (np. Baladex, Euphyllin Long, Theospirex)	❍	❍

Pytanie	Odpowiedź TAK lub NIE WIEM	**Odpowiedź NIE**
- erytromycyna (np. Davercin, Erythromycinum TZF) - klarytromycyna (np. Klacid, Fromilid, Klabax, Lekoklar, Taclar) - ryfampicyna (np. Rifamazid, Rifampicyna TZF)		
Czy stosuje Pan lub zamierza użyć środków uwalniających tlenek azotu, pobudzających doznania seksualne, podawanych drogą inhalacyjną tzw. poppers?	❍	❍
Od ostatniego użycia innych leków na zaburzenia potencji (sildenafil, wardenafil) upłynęło więcej niż 48h; W celu kontroli użycia może Pan notować ich przyjęcie poniżej: Lek: ……. Data przyjęcia …… Godzina przyjęcia ……..…….. Lek: ……. Data przyjęcia …… Godzina przyjęcia ……..…….. Lek: ……. Data przyjęcia …… Godzina przyjęcia ……..…….. Lek: ……. Data przyjęcia …… Godzina przyjęcia ……..…….. Lek: ……. Data przyjęcia …… Godzina przyjęcia ……..……..	❍	❍



Przed zastosowaniem leku przeczytaj ulotkę dołączoną do opakowania. Lek NIE jest przeznaczony do stałego, codziennego przyjmowania. Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz zastosować lek Tadalafil Fortis, przed użyciem leku skonsultuj się z farmaceutą. PAMIĘTAJ! Problemy ze wzwodem mogą być wywołane innymi lekami, które przyjmujesz lub innymi chorobami, na które cierpisz. Właściwe leczenie niektórych schorzeń może spowodować ustąpienie zaburzeń wzwodu. Występowanie zaburzeń wzwodu jest również ważną wskazówką dla lekarza, która może pomóc mu w diagnostyce niektórych chorób, w tym serca. Dlatego też w trakcie okresowych wizyt, zawsze poinformuj swojego lekarza o problemach ze wzwodem i o tym, że przyjmujesz Tadalafil Fortis.